

Steeds vaker gewone borstvoeding gegeven door jonge moeders met reuma

Steeds meer jonge moeders met de chronische ziekte reumatoïde artritis geven hun baby borstvoeding, ondanks het feit dat zij medicijnen gebruiken om hun ziekte te onderdrukken. Dat blijkt uit een onderzoek van de afdeling reumatologie in het Erasmus MC.



Afbeelding van gdakaska via Pixabay

Het aantal jonge moeders met reuma dat hun baby moedermelk geeft, is zelfs nagenoeg gelijk aan het aantal gezonde vrouwen dat dit doet. Dat blijkt uit een onderzoek van de afdeling reumatologie in het Erasmus MC.

De toename is naar alle waarschijnlijkheid te danken aan een combinatie van goede begeleiding tijdens de zwangerschap en het feit dat inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat moderne reumamedicatie veilig kan worden gebruikt tijdens zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding. Afhankelijk van de soort medicatie moet die worden geslikt of geïnjecteerd.

De studie werd verricht door Erik Kemper en Nafise Ghalandari, onder leiding van afdelingshoofd reumatologie dr. Radboud Dolhain. De studie komt voort uit een samenwerking van de afdeling Reumatologie met het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van ReumaNederland en een financiële bijdrage van het bedrijf UCB. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift RMD Open.

(Bron en verder lezen: Zorgkrant)