

# Wie loopt het meeste risico op 'lange covid'?

De aandacht is tot nog toe vooral gericht op de acute fase van een besmetting met covid-19, maar vroege studies wijzen bij sommige patiënten ook op gevolgen op langere termijn. Frances Williams, genetisch epidemioloog aan King's College in Londen, analyseert wat er tot nu toe geweten is over "lange covid".




Photo by cottonbro from Pexels

Meestal leidt een infectie met SARS-CoV2 – het virus dat covid-19 veroorzaakt – tot milde, kortdurende symptomen, acute ademhalingsproblemen of helemaal geen symptomen. Sommige mensen houden echter langdurig klachten, wat ook wel 'lange covid' wordt genoemd.

Als we definiëren wie risico loopt op lange covid en welke mechanismen daarbij betrokken zijn, kunnen we passende behandelingen proberen of nagaan of actie in een vroeg stadium van de ziekte leidt tot verbetering.

Lange covid wordt gekenmerkt door een groep symptomen,

inclusief – wisselende – kortademigheid, duidelijke vermoeidheid, hoofdpijn en verlies van normale smaak en reuk. Een relatief omvangrijke studie onder 384 personen die ziek genoeg waren om met covid-19 in het ziekenhuis te belanden, liet zien dat 53 procent van hen één of twee maanden later nog snel buiten adem was, dat 34 procent nog hoestte en dat 69 procent vermoeidheid rapporteerde.

Een vroege analyse van zelfgerapporteerde gegevens via de COVID Symptom Study-app stelt dat 13 procent van de personen met covid-19-symptomen die 28 dagen of langer hebben, terwijl bij 4 procent de symptomen langer dan 56 dagen aanhouden.

*(Bron en volledig artikel Knack.be)*